

# Abejas silvestres de St. Vrain Greenway ☒

## Abejas silvestres comunes



- Solitarias pero anidan en grupos
- ☒ Transportan polen en sus patas traseras



### Abejorro

- 11-23 mm
- Activas todo el verano
- Anidan en viejos nidos de roedores
- Sociales con reina y obreras
- Transportan polen en sus patas traseras



### Abeja enmascarada

- 4-6 mm
- Activas todo el verano
- Anida en ramas huecas
- Solitarias
- Hembras transportan polen en el estómago



### Abeja del sudor

- 9-15 mm
- Activas todo el verano
- Anidan en el suelo
- Semi-sociales
- Transportan polen en las patas traseras



### Abeja albañil


- 6-12 mm
- Activa al inicio del verano
- Anida en huecos
- Solitarias
- Transporta polen en su abdomen



### Abeja parasita

- 5-22 mm
- Activas todo el verano
- Parasitan los nidos de las abejas cortadoras de hojas
- Parasitas solitarias
- No colectan polen

## Disminución en especies de abejas después de la inundación



## Flores comúnmente visitadas por abejas



1. Falsa margarita

Fotografías de abejas del departamento de Agricultura de Oregon

Fotografía de abeja enmascarada de Steve Buchanan

## Las abejas melíferas no son consideradas abejas silvestres.

Las abejas melíferas son comunes en Colorado y el St. Vrain Greenway. Aunque son importantes polinizadores para la agricultura, no son consideradas abejas silvestres. Las abejas de la miel fueron introducidas a Norte América en los años 1600s, provenientes de Europa. A diferencia de la mayoría de las especies de abejas, las abejas melíferas son una especie social con reinas, trabajadoras y drones que viven en una colonia perene.